

接受輸卵管攝影檢查的另類後遺症？

一位 35 歲女性到試管嬰兒門診，希望能再次檢查兩側輸卵管是否通暢。在大約 6 個月前，此女士因為不孕而接受輸卵管攝影檢查，他院主治醫師告知由輸卵管的 X 光片發現兩側輸卵管近端靠近子宮的部位不通，建議直接接受試管嬰兒療程。但婆婆因此強令小倆口離婚，離婚後此女士想要證實兩側輸卵管是否真有阻塞。經過門診討論決定以腹腔鏡來檢查，在全身麻醉下以甲基藍顯影劑注入子宮頸口，結果發現不僅兩側輸卵管的外觀正常，藍色的顯影液體也很順利的由兩側輸卵管的繖部流出。回診時，雖然感謝我們解釋病情後讓她平反這個不存在的離婚原因，終於還她清白，但換藥時仍不由得悲從中來。

輸卵管攝影應稱為子宮輸卵管攝影檢查，因除了檢查兩側輸卵管是否通暢外，還可以經由檢查得知子宮是否有先天性構造異常，子宮內部是否因後天感染流產造成子宮腔沾粘、以及腫瘤如黏膜下肌瘤或息肉等。輸卵管攝影主要適應症為患有不孕或習慣性流產等因素，檢查的適當時機為月經結束後排卵前最適宜。月經正常的婦女相對較好安排檢查時間，一旦有月經異常的疑慮，應排除懷孕或感染的可能，再接受檢查以避免往後不必要的困擾…